

中村公園 さくらマップ



- 凡 例
- ★ 太閤しだれ桜
 - ★ 蜂須賀桜
 - オオシマザクラ
 - カ カワヅザクラ
 - カ カンザン
 - シ シダレザクラ
 - シロタエ
 - ★ ジンダイアケボノ
 - ソ ソメイヨシノ
 - ヤ ヤマザクラ
 - 白 ヨウコウ



～お願い～

- ・ゴミはお持ち帰りください。
 - ・無人の場所取りはご遠慮ください。
 - ・バーベキューはご遠慮ください。
- みなさんでゆずり合って
桜をお楽しみください





太閤しだれ桜

エドヒガン系しだれ性変種。醍醐寺に現存している「太閤しだれ桜」のクローン桜で病気に強い。



蜂須賀桜

江戸時代には門外不出として限られた人しか見られない歴史的な価値を持つ桜。3月中旬開花。



オオシマザクラ

葉や花が大きく、花に芳香のあるものも多い。4月上旬に開花。



カワツザクラ

オオシマザクラとカンヒザクラの交雑による栽培品種。2月から3月上旬に開花。



カンザン

花色が濃紅色で美しく、生育もよいので海外でも広く栽培されている。4月下旬に開花。



シダレザクラ

エドヒガンの枝が枝垂れたもので、個体により花色や花の大きさに変異が多くみられる。3月下旬に開花。



シロタエ

東京府江北村（現・東京都足立区）の荒川堤で栽培されていた品種。4月中旬に開花。




ジンダイアケボノ

ソメイヨシノより病気に罹りにくく、近年ソメイヨシノの代わりに植えられる。ソメイヨシノよりやや早く咲く。




ソメイヨシノ

エドヒガンとオオシマザクラの園芸種との交配種。4月上旬に開花。



ヤマザクラ

古来より観賞の対象とされた桜で成木の成葉裏面が帯白色になる特徴がある。4月中旬に開花。



ヨウコウ

アマギヨシノとカンヒザクラの交雑種。ソメイヨシノより早く咲く。

